

ISMERŐSÖK KÖZÖTT

Tíz élőlény rövid leírását olvashatjátok az alábbiakban. Felismeritek őket? Segítségül eláruljuk a nevükben előforduló magánhangzókat.

a) Vízen úszó páfrány. Levelei hármás örvben állnak: kettő úszólevél, a harmadik gyökérszerű, sallangos és víz alá merül. Spóratartói gömb alakúak, s az úszó levelek tövén fejlődnek. (UAÖÖ)

b) Vízidiónak, vízigesztenyének nevezett, fehér virágú növény. Termését régen juhfarokkal halászták, s fogyasztották. Vízen úszó levelei trapéz formájúak. (UO)

c) Kétlaki, fehérvirágú növény. Levelei szív formájúak, mintha kiharaptak volna belőle egy kis darabkát. Talán ezért hívják a németek békaharapásnak. (ÉAUA)

d) Állóvizekben, folyók kiöntéseiben gyakori, sima szárnyfedőjű, elől-hátul elkeskenyedő bogár. Lomha mozgású lávája ragadozó, a kifejlett bogár növényevő. (ÓIÁ / IO)

e) Gyors folyású, tiszta vizű patakok nagy oxigénigényű lakója. Többnyire alkonyatkor és éjjel aktív. A Kárpá-medencében őshonos hal. (EE / IÁ)

f) Jobb és bal oldali úszóit felváltva használó védett hal. Kutyahalnak is nevezik. (ÁI / Ó)

g) 80-100 centiméteresre megnövő hüllőnk. Tarkójának két oldalán sárga félhold alakú folt látható. (ÍIIÓ)

h) Nyújtott nyakkal repülő, fehér tollú, kiszélesedő csőrű, fekete lábú, vörös szemű madár. Szívesen fogyaszt piócát, ebihalat. Fején a megnyúlt tarkótollak lelógó bóbitát alkotnak. (AAAÉ)

i) Nagy telepeken élő, nászidőben csokoládébarna fejű, vízimadarunk. Télen a barna fejre csak egy szürkés pont emlékeztet a fül tájékán. Sok rovarot fogyaszt. (AAIÁ)

j) Hosszú farkú madár. A hímek szemétől a torok két oldalán fekete barkó húzódik lefelé. Sűrű nád közé alacsonyan építi fészket. Rovarokkal és nádmaggal táplálkozik. (AÓ / IEE)